

بررسی عوامل خطر بیماری‌های قلبی-عروقی در سالمندان استان ایلام در سال ۱۳۹۰

شبینم شکوهی^۱، مهران بابازاد^۲، رضا بیرانوند^۳، مینم بهزادی فر^۴، دکتر علی دلپیشه^{۵*}

۱. دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام

۲. کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام

۳. مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب‌های روانی-اجتماعی، و گروه اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام

چکیده

سابقه و هدف: با افزایش سن، خطر بیماری‌های مزمن از جمله بیماری‌های قلبی-عروقی افزایش می‌یابد. این بیماری‌ها، علت اصلی مرگ در افراد ۶۰ سال و بالاتر در هر دو جنس است. پژوهش حاضر با هدف تعیین شیوه بیماری‌های قلبی-عروقی و عوامل خطر آن در سالمندان استان ایلام در سال ۱۳۹۰ انجام شده است.

مواد و روش‌ها: در مطالعه‌ای توصیفی-مقطوعی در سال ۱۳۹۰، تعداد ۱۰۱۲ نفر از سالمندان بالای ۶۰ سال ساکن استان ایلام، از طریق نمونه‌گیری خوش‌های به صورت تصادفی انتخاب شدند.داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته، گردآوری و توسط نرم‌افزار SPSS-16 تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: میانگین سنی افراد تحت مطالعه، $۷۰/۱\pm ۸/۰$ سال بود. در مجموع، ۳۶٪ از سالمندان مورد مطالعه به بیماری‌های قلبی، ۵۳٪ به فشار خون بالا، ۱۵٪ به دیابت و ۴۰٪ به اختلال خواب مبتلا بودند. همچنین، ۱۶٪ به سیگار اعتیاد داشتند. میانگین توده‌ی بدنه بدنی $۷۷/۴\pm ۴/۲$ بود. فراوانی بستری شدن به علت بیماری قلبی، در بین زنان بیشتر بود ($p < 0/۰۰۱$). در بین زنان مشاهده شد ($p < 0/۰۰۱$). همچنین، تشخیص دیابت در زنان بیشتر از مردان مشاهده شد ($p < 0/۰۰۱$). در این مطالعه، اختلال خواب در زنان سه برابر بیشتر از مردان مشاهده شد ($p < 0/۰۰۱$). ($OR = ۳/۰۵$, $CI: ۲/۳۳-۳/۹۹$, $p < 0/۰۰۱$).

نتیجه‌گیری: ابتلای بیش از یک سوم از سالمندان به بیماری‌های قلبی و بیش از نیمی از آنها به پرفشاری خون، نگران کننده است. با عنایت به این نکته که بخش زیادی از بیماری‌های قلبی-عروقی قابل پیشگیری است، توجه بیشتر به این بیماری‌ها و ارائه خدمات پیشگیری برای عوامل خطر مرتبط با آن از جمله دیابت، چاقی و استعمال دخانیات، ضروری به نظر می‌رسد.

واژگان کلیدی: سالمندان، بیماری‌های قلبی-عروقی، عوامل خطر

لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:

Shokouhi S, Babanejad M, Beiranvand R, Behzadifar M, Delpisheh A. Risk factors associated with cardiovascular diseases in elderly in Ilam Province in 2012. Pejouhandeh 2013;18(4):195-201.

مقدمه

سازمان جهانی بهداشت، در کشورهای در حال توسعه، جمعیت سالمندان در طی ۵۰ سال آینده، ۹ برابر افزایش خواهد یافت (۴). سازمان ملل متحده، تعداد سالمندان جهان را در سال ۲۰۰۶، ۶۸۷ میلیون و ۹۲۳ هزار نفر برآورد کرد که این تعداد در سال ۲۰۵۰ به رقم بیش از یک میلیارد نفر خواهد رسید (۱، ۳، ۵ و ۶). طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، حدود ۷/۲۷٪ از جمعیت کشور را سالمندان بالای ۶۵ سال تشکیل می‌دهند (۵).

با افزایش سن، خطر بیماری‌های مزمن از جمله بیماری‌های قلبی-عروقی، افزایش می‌یابد (۷). این بیماری‌ها، کیفیت

پیشرفت در علوم پزشکی و بهداشتی در نیمه دوم قرن بیستم و افزایش امید به زندگی، باعث افزایش نسبی طول عمر افراد شده است. همین امر موجب گردیده تا به جمعیت سالخورده‌گان و به تبع آن، بر جمعیت سالمندانی که نیازمند خدمات پزشکی هستند، افزوده شود (۱-۳). طبق برآورد

*نویسنده مسؤول مکاتبات: دکتر علی دلپیشه؛ دانشیار اپیدمیولوژی بالینی، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، صندوق پستی: ۶۹۳۱۵-۰۹۱۲۱۳۰۷۵۷۷، تلفن: ۰۸۴۱۲۲۲۷۱۰۳؛ پست

الکترونیک: alidelpisheh@yahoo.com

گرداوری داده‌ها با استفاده از یک پرسشنامه‌ی استاندارد که در سایر مطالعات کشوری نیز مورد استفاده قرار گرفته بود، صورت پذیرفت. روایی این پرسشنامه با بهره‌گیری از نظرات اساتید صاحب نظر در حیطه‌های سالمندان، اپیدمیولوژی بالینی، پژوهشکار اجتماعی و پرستاری سالمندان، مورد تأیید قرار گرفت. جهت تأیید پایابی، ۱۲ نفر از سالمندان شهر ایلام به طور کاملاً تصادفی در یکی از محلات مرکز شهر انتخاب گردیده و مصاحبه با آنان صورت پذیرفت که با نظر مشاور آماری و همکاران طرح، تعدادی از سؤالات پرسشنامه، مورد بازنگری قرار گرفت. پایابی پرسشنامه با استفاده از شاخص آلفای کرونباخ، ۷۸٪ ارزیابی گردید. پرسشنامه‌ی نهایی، شامل دو بخش اصلی بود: بخش اول حاوی سؤالاتی در خصوص وضعیت دموگرافیک سالمندان شامل سن، جنس، سواد، وضعیت تأهل، درآمد و شغل، و بخش دوم حاوی سؤالاتی در خصوص سابقه‌ی ابتلا به بیماری‌های مزمن مانند بیماری‌های کرونری قلب، دیابت و پرفشاری خون بود. افرادی که اظهار به داشتن بیماری‌های قلبی- عروقی می‌کردند، با مراجعه به پزشک معالج آنها که از طریق پرسیدن از سالمندان مشخص می‌شد، با مطالعه‌ی پرونده‌ی فرد، نوع بیماری قلبی- عروقی وی مشخص می‌گردید. در صورت ابتلای فرد به بیماری قلبی غیر از بیماری‌های کرونری قلب، وی به عنوان بیمار مبتلا به بیماری قلبی- عروقی محسوب نمی‌شد. دلیل انتخاب فقط بیماری‌های کرونری به عنوان بیماری قلبی- عروقی، تأثیر ریسک فاکتورهای مورد مطالعه در بیماری‌های کرونری است. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوش‌های، نقشه‌ی شهری و با توجه به تراکم جمعیت در نقاط مختلف جغرافیایی، از هر یک از مناطق شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز هر یک از شهرستان‌های استان ایلام، یک خیابان به صورت تصادفی از فهرست خیابان‌های آن منطقه انتخاب شده و پژوهشگر با مراجعه به درب منازل واقع در آن خیابان، در صورت حضور فرد واحد شرایط شرکت در مطالعه، از ایشان دعوت به عمل می‌آورد. سپس، پرسشنامه تکمیل می‌شد و اندازه‌گیری‌های مورد نیاز، صورت می‌گرفت. برای هر خوش، حجم نمونه‌ای معادل ۲۴ نفر در نظر گرفته شده بود. مراجعه به درب منازل، از ابتدای خیابان مورد نظر شروع شده و تا آنجا ادامه می‌یافت که حجم نمونه‌ی مورد نیاز کامل می‌شد. در صورتی که فرد واحد شرایط شرکت در مطالعه، در خانه‌ی مورد مراجعت وجود نداشت، ضمن عذرخواهی و تشکر، به خانه‌ی بعدی مراجعته می‌شد. در منطقه‌ی مرکزی شهر ایلام، به طور استثناء و به واسطه‌ی وسعت و تراکم بیشتر، ۲۵ نفر وارد مطالعه شدند تا

زندگی افراد سالمند را تحت تأثیر قرار داده و موجب ناتوانی و یا کاهش توانایی زندگی مستقل در آنها می‌گردد (۸). بیماری‌های قلبی- عروقی، علت اصلی مرگ در افراد ۶۵ ساله و بالاتر در هر دو جنس است (۹-۱۱). عوامل خطر آن شامل فشار خون بالا، استعمال دخانیات، شیوه‌ی زندگی بی‌تحرک، چاقی و دیابت می‌باشد (۱۰ و ۱۱). شیوع دیابت نوع ۲ در سالمندان بالای ۶۵ سال، حدود ۱۰٪ گزارش شده است (۱۲). مهمترین عارضه‌ی دیابت، بیماری عروق کرونری قلب است که در مقایسه با جمعیت غیر دیابتیک، با افزایش ابتلا و مرگ و میر در سالمندان همراه است (۱۱). فشار خون بالا، به عنوان خطر بزرگ بیماری‌های قلبی- عروقی مطرح است (۹ و ۱۱)، به خصوص فشار خون سیستولیک که یکی از قدرتمندترین نشانگرها برای این بیماری در افراد سالخورده محسوب می‌شود (۱۳). میزان شیوع آن در سالمندان بالای ۶۵ سال، بین ۶۰ تا ۷۰ درصد گزارش شده است. استعمال دخانیات نیز از جمله عوامل خطر مربوط به بیماری‌های قلبی- عروقی می‌باشد که در مقالات متعددی، به وجود ارتباط آن با این بیماری‌ها، توجه شده است (۱۴ و ۱۵).

با توجه به روند رو به رشد جمعیت سالمند، می‌توان پیش‌بینی نمود که بیماری‌های قلبی- عروقی در آینده به یک مشکل بهداشت عمومی مهم تبدیل خواهد شد. بر همین اساس، تعیین شیوع این بیماری‌ها و عوامل خطر مرتبط با آن در میان سالمندان جامعه، می‌تواند زمینه را جهت برنامه‌ریزی مدون‌تر به منظور افزایش سطح سلامت و کیفیت زندگی این افراد در جامعه، فراهم سازد. مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین فراوانی بیماری‌های قلبی- عروقی و عوامل خطر مربوطه، در سالمندان صورت گرفته است.

مواد و روشها

این مطالعه، به روش توصیفی- مقطعي در سال ۱۳۹۰ جهت تعیین وضعیت سلامت سالمندان در استان ایلام انجام شد و در آن ۱۰۱۲ نفر از سالمندان ساکن شهر ایلام با میانگین سنی 48.0 ± 8.0 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. معیار ورود به مطالعه (مطابق با دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت)، داشتن سن ۶۰ سال و بالاتر بود. حجم نمونه با توجه به جامعه‌ی آماری و جمعیت سالمندان استان ایلام بر اساس آخرین آمارها در هنگام اجرای طرح، با فرض شیوع ۵ درصدی و سطح اطمینان ۹۵٪ و حداکثر خطای ۵٪، با استفاده از نرم افزار StatCalc تحت برنامه‌ی Epi-info ۱۰.۱۲ نفر تعیین گردید.

پیاده روی که به عنوان ورزش های سبک طبقه بندی می شوند، تعریف شده اند.

داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS (نگارش ۱۶) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها

در مجموع، ۱۰۱۲ سالمدن، مورد مطالعه قرار گرفتند که ۶۱۲ نفر (۶۰/۵٪) مرد و ۴۰۰ نفر (۳۹/۵٪) زن بودند (جدول ۱). میانگین سنی افراد تحت بررسی ۷۰/۱ سال با انحراف معیار ۸/۰۲۵ بود. بیشتر سالمدنان مورد مطالعه (۳۰/۱٪)، در گروه سنی ۶۵-۶۹ سال بودند. ۵۱/۴٪ از سالمدنان مورد مطالعه، در مناطق شهری و ۴۸/۶٪ در مناطق روستایی ساکن بوده اند.

جدول ۱. اطلاعات دموگرافیک سالمدنان استان ایلام شرکت کننده در مطالعه و ارتباط آنها با بیماری های قلبی در سال ۱۳۹۰-۹۱.

(تعداد) درصد	نام متغیر
۳۹/۵ (۴۰۰)	زن
۶۰/۵ (۶۱۲)	مرد
۵۱/۴ (۵۲۰)	شهر
۴۸/۶ (۴۹۲)	روستا
۱۹/۰ (۱۹۱)	شاغل
۸۱/۰ (۸۱۴)	بیکار
۶۹/۷ (۷۰۰)	دارای همسر
۲۷/۹ (۲۸۰)	بدون همسر به دلیل فوت همسر
۱/۷ (۱۲)	بدون همسر به دلیل طلاق
۰/۳ (۳)	هرگز ازدواج نکرده
۱/۰ (۱۰)	زندگی دور از همسر
۶۱/۴ (۶۱۷)	بی سواد
۲۱/۰ (۲۱۱)	نهضت سوادآموزی
۶/۳ (۶۳)	فقط در حد خواهند
۵/۳ (۵۳)	دیپلمستان
۶/۱ (۶۱)	دیپلم و بالاتر

در مطالعه حاضر، ۳۶/۱٪ از سالمدنان، دارای سابقه ای ابتلاء به بیماری های قلبی بودند (جدول ۲). همچنین، ۷۰/۱٪ از افراد مورد مطالعه، دارای سابقه بیماری قلبی بوده یا سابقه بستری شدن در بیمارستان ناشی از بیماری قلبی را داشتند که ۲۰/۳٪ از آنها در زمان بستری، مورد عمل جراحی هم قرار گرفته بودند. در مجموع، ۸۳/۱٪ از افراد مورد مطالعه، از دارو برای کاهش علایم بیماری خود استفاده می کردند و ۵۳٪ از

در مجموع ۱۰۱۲ نمونه مورد نیاز بر اساس فرمول حجم نمونه تکمیل گردد. مصاحبه با نمونه ها، با کسب رضایت کتبی از خانواده و خود سالمدن صورت می گرفت. در صورت وجود دو یا بیشتر از دو فرد سالمدن واجد شرایط در یک خانواده، به طور تصادفی یک نفر از آنان انتخاب و وارد مطالعه می گردید. اندازه گیری قد، وزن، نسبت، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، بعد از مصاحبه با سالمدنان و تکمیل پرسشنامه، صورت می گرفت. اندازه گیری قد برای سالمدنانی که می توانستند بدون قوز در کمر یا پاها، به راحتی بایستند، در حالت ایستاده و نزدیک به دیوار با استفاده از متر نواری انجام می گرفت. ولی برای سایر سالمدنان که قادر به ایستادن نبودند، با استفاده از مقیاس اندازه گیری شاخص توده بدن مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ابتدا فاصله هی فوقانی زانو تا کف پا اندازه گیری و سپس بر اساس راهنمای آن بر حسب این فاصله، سن و جنس سالمدن، قد واقعی وی اندازه گیری می شد. وزن سالمدنان با استفاده از ترازوی دیجیتالی با دقت ۱۰۰ گرم، حداقل لباس و بدون کفش اندازه گیری می شد. اندازه گیری فشار خون نیز از دست راست، در حالت نشسته و بعد از ۳۰ دقیقه استراحت و تکمیل پرسشنامه، صورت می گرفت. جهت اندازه گیری متغیرهای مورد بررسی همچون ابتلاء به بیماری قلبی - عروقی و عوامل خطر مربوط به آن از قبیل دیابت و فشار خون، پرسشگر مطالعه، با توجه به داروهای مصرفی فرد مورد بررسی و با استفاده از چک لیست داروهای روتین برای هر کدام از این بیماری ها که از قبل با مشورت با پزشک متخصص هر بیماری تهیه شده بود، پرسشنامه را تکمیل می کرد. جهت اندازه گیری سایر متغیرهای مورد پرسش در پرسشنامه، به دلیل اینکه ممکن بود خود فرد سالمدن، توانایی درک صحیح پرسش ها و پاسخ دهی صحیح را نداشته باشد، از یکی از اعضای خانواده می سالمدن مورد بررسی که به وضعیت سلامت و بیماری وی آگاه بود، کمک گرفته می شد.

براساس راهنمای آموزشی مراقبت های ادغام یافته هی سالمدن، اختلالات خواب، با معیارهای بیدار شدن صبح زودتر از حد معمول، به رختخواب رفتن در شب دیرتر از معمول، داشتن مشکل به خواب رفتن و بیدار شدن های شباهه شبانه، احساس غمگینی، اگر سالمدن عنوان کند که گاهی احساس غم و افسردگی دارد؛ فعالیت ورزشی منظم به صورتی که حداقل سه بار در هفته (یک روز در میان) و هر جلسه ۳۰-۴۵ دقیقه انجام شود، انجام پنج جلسه ورزش با مدت زمان ۳۰-۴۵ دقیقه به عنوان ورزش سنجین و فعالیت های نرمیش و

عوامل خطر بیماری‌های قلبی- عروقی در سالمندان استان ایلام

تشخیص پزشک مربوطه، به دیابت مبتلا بوده‌اند که از این بین، $63/4\%$ از رژیم درمانی انسولین و $3/3\%$ از رژیم غذایی جهت کنترل بیماری خود استفاده می‌کردن. ضمناً $33/6\%$ نیز از هیچ روش درمانی پیروی نمی‌کردن. میانگین فشار خون، وزن، قد، سن و شاخص توده‌ی بدنه افراد، در جدول ۳ نشان داده شده است.

جدول ۳. میانگین فشار خون، وزن، قد، سن و شاخص توده‌ی بدنه سالمندان استان ایلام شرکت کننده در مطالعه در سال ۱۳۹۰-۹۱.

انحراف معیار	میانگین	متغیر
$23/38$	$133/038$	فشار خون (میلی‌متر جیوه)
$11/02$	$76/11$	دیاستولیک
$12/047$	$66/37$	وزن (کیلوگرم)
$8/025$	$70/1$	سن (سال)
$9/42$	$160/67$	قد (سانتی‌متر)
$4/48$	$25/72$	شاخص توده بدنه (Kg/m^2)

اختلاف معنی‌داری بین مردان و زنان سالمند مورد مطالعه از نظر بستره شدن به علت بیماری قلبی مشاهده شد ($p<0/0001$). به نحوی که فراوانی بستره شدن به علت بیماری قلبی در بین زنان بیشتر بود ($25/7/66$ CI; $95/9\%$). اختلاف معنی‌داری نیز بین مردان و زنان سالمند مورد مطالعه از نظر تشخیص دیابت توسط پزشک مشاهده شد ($p<0/0001$). به نحوی که در جنس مؤنث، بیشتر رخ داده است. همچنین، اختلاف معنی‌داری بین مردان و زنان سالمند مورد مطالعه، از نظر اختلال خواب مشاهده شد ($p=0/0001$). به نحوی که زنان سالمند سه برابر بیشتر از مردان سالمند دچار اختلال خواب بوده‌اند (CI; $23/3-3/99$). با این وجود، اختلالات تنفسی در مردان سالمند بیشتر از زنان سالمند بود ($p<0/0001$).

علاوه بر این، ارتباط معنی‌داری میان شیوع بیماری قلبی و وضعیت تأهل مشاهده شد ($p<0/0001$). به نحوی که بیماری قلبی تشخیص داده شده در بین افراد متأهل بیشتر بود. همچنین، ارتباط معنی‌داری بین وضعیت تحصیل و شیوع بیماری قلبی مشاهده شد، به طوری که بیماری قلبی تشخیص داده شده در میان افراد بی‌سواد، بیشتر بود ($p<0/0001$).

همچنین، بین شیوع بیماری قلبی و انجام فعالیت ورزشی نیز ارتباط معنی‌داری مشاهده شد، به این ترتیب که شیوع بیماری قلبی در افرادی که فعالیت ورزشی انجام نمی‌دادند، بیشتر از افرادی بود که فعالیت ورزشی انجام می‌دادند (OR=۰/۶۷، $p<0/009$, CI; $0/51-0/90$, $p<0/009$).

آنها، دارای سابقه‌ی فشار خون بالا هم بوده‌اند.

از بین افراد تحت مطالعه، $16/3\%$ به سیگار اعتیاد داشته و 41% سابقه‌ی اعتیاد به سیگار را ذکر کرده‌اند. به طور کلی، 17% از سالمندان مورد مطالعه، علاقه‌به استعمال دخانیات داشتند. در این مطالعه، $40/1\%$ از افراد، دچار اختلال خواب بودند. همچنین، $22/5\%$ از افراد تحت مطالعه، دچار مشکل تنفسی بودند به نحوی که $8/3\%$ از این افراد، از اسپری‌های برونکو‌دیلاتور و $2/1\%$ از کپسول اکسیژن استفاده می‌کردند. بیش از یک سوم افراد شرکت کننده در پژوهش ($36/5\%$)، فعالیت ورزشی انجام می‌دادند که از این تعداد، $18/7\%$ فعالیت ورزشی منظم و بیشتر آنها ($81/3\%$)، فعالیت ورزشی نامنظم انجام می‌دادند.

جدول ۲. فراوانی عوامل خطر بیماری‌های قلبی- عروقی در سالمندان استان ایلام.

نام متغیر	(تعداد) درصد
بیماری قلبی	$36/1$ (374)
دیابت	$14/8$ (141)
پر فشاری خون	$53/0$ (50.9)
اختلال خواب	$40/1$ (384)
مشکل تنفسی	$22/5$ (216)
اعتیاد به سیگار	$16/3$ (159)
احساس غمگینی	$45/6$ (437) $20/7$ (198) $18/8$ (180) $14/9$ (143)
شاخص توده بدنه (Kg/m^2)	$2/7$ (24) $42/0$ (369) $36/2$ (318) $16/2$ (142) $2/8$ (25)

فراوانی نشانه‌های اختلالات قلبی- عروقی در سالمندان مورد مطالعه، به این گونه بود که $43/7\%$ درد یا احساس ناراحتی و فشار در سینه خود داشته‌اند، 68% درد یا احساس ناراحتی به هنگام راه رفتن در سربالایی و $44/2\%$ از این افراد، در حال راه رفتن معمولی یا حتی در یک سطح صاف هم درد داشته‌اند. در حدود نیمی از سالمندان تحت بررسی ($52/6\%$)، محل درد یا احساس ناراحتی را جناغ سینه (بالا یا قسمت وسط)، $19/5\%$ جناغ سینه (قسمت تحتانی)، $2/6\%$ سمت چپ بخش قدامی قفسه‌ی سینه (قسمت بالا)، $21/4\%$ بازوی چپ و $3/9\%$ مناطق دیگر را اعلام داشته‌اند. در مجموع، 15% از سالمندان مورد مطالعه، بنا به

حسینی و همکاران در بابل (۱۳۸۵-۸۶)، شیوع بیماری‌های قلبی-عروقی ۲۹/۶٪ گزارش گردید (۲۰) که از مطالعه‌ی حاضر، کمتر بود. در مطالعه‌ی چغتایی و همکاران در کاشان (۱۳۸۳)، نزدیک به نیمی از سالمندان مبتلا به بیماری‌های قلبی-عروقی بوده‌اند (۲۱) که باز هم نسبت به مطالعه‌ی حاضر، شیوع بیشتری دارد. میانگین فشار خون سیستولیک افراد مورد مطالعه، ۱۳۳/۰۳۸ میلی‌متر جیوه با انحراف معیار ۷۶/۱۱ ۲۳/۳۸ و میانگین فشار خون دیاستولیک برابر با ۱۱/۰۲ میلی‌متر جیوه با انحراف معیار ۱۱/۰۲ بود. در مطالعه‌ی عزیزی و همکاران (۱۳۸۲) با عنوان قند و لیپید تهران، فشارخون سیستولیک و دیاستولیک زنان، بیشتر از مردان بود (۲۲).

پرفشاری خون، از عوامل مؤثر بر بروز بیماری‌های مزمن است، بنابراین غربالگری و شناسایی افراد مبتلا به پرفشاری خون و درمان آن، می‌تواند در پیشگیری از برخی بیماری‌های مزمن مؤثر باشد. آموزش همگانی در خصوص رژیم غذایی، ورزش، استعمال سیگار، مقابله با استرس و فشارهای زندگی، از جمله مواردی است که از ابتلای افراد به پرفشاری خون جلوگیری می‌کند.

در مجموع، ۱۵٪ از سالمندان مورد مطالعه، بر اساس تشخیص پزشک مربوطه، مبتلا به دیابت بوده‌اند که از بین این افراد، ۵۱/۵٪ از داروهای خوراکی پایین آورنده‌ی قند خون، ۱۱/۹٪ از انسولین تزریقی و ۰/۳٪ از رژیم غذایی جهت کنترل بیماری خود استفاده می‌کردند. ضمناً ۳۳/۶٪ نیز از هیچ روش درمانی پیروی نمی‌کردند. در مطالعه‌ی توتونچی و همکاران، ۱۵/۵٪ از سالمندان به بیماری دیابت مبتلا بوده‌اند (۱۹) که تقریباً مشابه با مطالعه‌ی حاضر می‌باشد. شیوع دیابت در مطالعه‌ی درستی و همکاران در اصفهان، ۱۷/۴٪ گزارش شده است (۱۸) که اندکی بالاتر از مطالعه‌ی حاضر می‌باشد. تماشای تلویزیون به مدت طولانی در طول شبانه روز، از عوامل مؤثر بر چاقی، دیابت و بیماری‌های قلبی است که در مطالعه‌ی درستی و همکاران ارتباط معنی‌داری با شیوع دیابت داشته است (۱۸). در مطالعه‌ی حسینی و همکاران، شیوع دیابت در زنان و مردان به ترتیب ۳۰/۸٪ و ۱۸/۴٪ گزارش شده (۲۰) که در مقایسه با مطالعه‌ی حاضر، شیوع دیابت در هر دو جنس بیشتر بوده است.

سیگار، یکی دیگر از عوامل مهم خطر بروز بیماری‌های قلبی-عروقی است که با ترک آن، خطر بروز این بیماری‌ها کاهش می‌یابد. در مجموع، ۱۶/۳٪ از افراد تحت مطالعه، به سیگار اعتیاد داشتند که ۹۵٪ از این افراد، اعتیادشان بین ۱ تا

ارتباط معنی‌داری بین شیوع بیماری قلبی با احساس غمگینی دیده شد، به نحوی که شیوع بیماری قلبی در افرادی که زیاد احساس غمگینی می‌کردند، بیشتر بود (۱۰۰٪ <p < 0.001).

بحث:

با وجود پیشرفت‌های زیادی که در زمینه‌ی تشخیص و درمان بیماری‌های قلبی-عروقی صورت گرفته، همچنان این بیماری‌ها، موجب بروز مشکلات جدی در عرصه‌های کلینیکی و بهداشت عمومی می‌شوند. فشارخون بالا، دیابت، استعمال دخانیات، اضافه وزن و چاقی، از مهمترین عوامل خطر شناخته شده در رابطه با بیماری‌های قلبی-عروقی هستند. این بیماری‌ها، عامل مهم مرگ و میر و ابتلا به بیماری‌ها، در بیماران سالمند بوده و بار مالی قابل توجهی را به نظام مراقبت بهداشتی- درمانی تحمیل می‌کند.

در مطالعه‌ی حاضر، شیوع بیماری قلبی-عروقی در سالمندان مورد مطالعه، ۳۶/۱٪ بود. در مطالعه‌ی شریفی راد و همکاران (۱۳۸۵) در اصفهان، ۳۲/۲٪ از سالمندان به بیماری قلبی مبتلا بوده‌اند که میزان شیوع آن از مطالعه‌ی حاضر، کمتر می‌باشد (۱۶). همچنین، ۱٪ ۷۰٪ از افراد مورد مطالعه دارای سابقه‌ی بیماری قلبی بوده یا سابقه‌ی بستری شدن در بیمارستان ناشی از بیماری قلبی را برای خود ذکر کرده‌اند که از این بین، ۲۰/۳٪ در زمان بستری، مورد عمل جراحی هم قرار گرفته بودند. در مجموع، ۸۳/۱٪ از افراد مورد مطالعه، برای کاهش عالیم بیماری خود، از دارو استفاده می‌کردند و ۵٪ از آنها دارای سابقه‌ی فشار خون بالا هم بوده‌اند. در مطالعه‌ی شریفی راد و همکاران (۱۳۸۵) در اصفهان، ۷٪ ۴۶٪ از سالمندان، به فشار خون بالا مبتلا بوده‌اند که میزان آن، از مطالعه‌ی حاضر کمتر می‌باشد. همچنین ۱۰٪ از آنان، حداقل یک بار سابقه‌ی سکته‌ی قلبی داشته‌اند (۱۶). در مطالعه‌ی اکبری کامرانی و همکاران (۱۳۸۰) در تهران، ۳٪ ۶۳٪ از سالمندان، سابقه‌ی ابتلا به بیماری‌های قلبی- ریوی داشته‌اند (۱۷). درستی و علوی (۱۳۸۳) که ۱۶۹۴ نفر از سالمندان ساکن اصفهان را مورد مطالعه قرار داده بودند، شیوع بیماری قلبی را ۴٪ ۲۶٪ گزارش کردند (۱۸). در مطالعه‌ی توتونچی و همکاران (۱۳۸۳)، شیوع بیماری‌های قلبی و پرفشاری خون در سالمندان را به ترتیب ۴٪ ۱۵٪ و ۳٪ ۷٪ گزارش کرده بودند (۱۹) که البته شیوع پرفشاری خون در مطالعه‌ی حاضر، بیشتر می‌باشد. در مطالعه‌ی درستی و همکاران در اصفهان (۱۳۸۶)، شیوع بیماری‌های قلبی-عروقی، ۴٪ ۲۶٪ از این بیماری‌ها، گزارش شد (۱۸) که بسیار کمتر از مطالعه‌ی حاضر می‌باشد. همچنین، در مطالعه‌ی

روزانه مانند خرید، پیاده روی می‌کردند، ۴۰/۶٪ از پیاده روی به منزله ورزش استفاده می‌کردند، ۹/۶٪ ورزش منظمی داشتند و تقریباً از هر ۱۰ سالمند مورد مطالعه، یک نفر (۰/۹٪) به طور منظم به فعالیت‌های ورزشی پرداخته‌اند. میزان فعالیت فیزیکی برای سالمندان ۶۵ سال به بالا، انجام حداقل ۳۰ دقیقه به صورت فعالیت‌های شدید یا متوسط، پیاده‌روی به صورت شدید یا متوسط و یا پیاده‌روی حداقل ۵ روز در هفته‌ی گذشته، تعریف شده است. در مطالعه‌ای که روی سالمندان ایرانی مقیم سیدنی انجام شده است، فقط ۲۶/۵٪ از سالمندان، فعالیت‌های متوسط به صورت پیاده‌روی حداقل ۵ روز در هفته و فعالیت فیزیکی کافی به مدت حداقل ۳۰ دقیقه در روز انجام می‌دادند و ۳۳٪ آنان هیچ نوع فعالیتی را در سطح متوسط در هفته‌ی منتهی به زمان اجرای مطالعه، نداشتند (۲۴).

ابتلای بیش از یک سوم از سالمندان به بیماری‌های قلبی- عروقی و بیش از نیمی از آنها به پرفشاری خون، نگران‌کننده است. با عنایت به این نکته که بخش زیادی از بیماری‌های قلبی قابل پیشگیری می‌باشد، توجه بیشتر به این بیماری و ارائه خدمات پیشگیری از عوامل خطر مرتبط با آن، از جمله دیابت، چاقی و استعمال دخانیات ضروری به نظر می‌رسد.

تشکر و قدردانی

با تشکر از آقایان هادی پیمان و امین صید محمدی که ما را در انجام این طرح یاری رساندند.

REFERENCES

1. Hatamti H, Razavi SM. Elderly Health. Public Health. 2nd ed. Tehran: Arjomand; 2009. p. 1836–93.
2. World Health Organization factsheet. Available from: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/index.html>. Accessed January 2008.
3. Sharifzade GHR, Moodi M, Akhbari SH. Investigating health status of older people supported by Imam Khomeini relief foundation in birjand in 2007. Salmand 2010;5(17):52–9. (Full Text in Persian)
4. Sadat Madah SB, Emami A, Rahgozar Mahdi, Foroughan M, Norouzi K, Mohammadi F, et al. The status of social and leisure time activities in the elderly rising in Iran and Sweden. Salmand 2008;8(3):597–606. (Full Text in Persian)
5. Manzouri L, Babak A, Merase MR. The depression status of the elderly and its related factors in Isfahan in 2007. Salmand 2010;14(4):27–33. (Full Text in Persian)
6. Hosseini SH, Keshavarz SA, Maleki M, Amin A, Bakhshandeh Abkenar H. Nutritional status and non-diet associated factors of hospitalized heart-failure elderly patients. Salmand 2010;5(16):61–6. (Full Text in Persian)
7. Habibi A, Savadpoor MT, Molaei B, Shamshiri M, Ghorbani M. Survey of physical functioning and prevalence of chronic illnesses among the elderly people. Salmand 2009;4(13):67–77. (Full Text in Persian)
8. Canbaz S, Sunter AT, Dabak S, Peksen Y. The Prevalence of chronic diseases and quality of life in elderly people in Samsun. Turk J Med Sci 2003;33:335–40.
9. Lye M, Donnellan C. Heart disease in the elderly. Heart 2000;84(5):560–6.
10. World Health Organization. Gender and Health and Ageing. Available from: www.who.int/ageing/gender/en/index.html. Accessed 2003.

۲۰ سال به طول انجامیده است. همچنین، ۴۳٪ از افراد تحت مطالعه، بین صفر تا ۱۰ سال، ۵۲٪ بین ۱۱ تا ۱۹ سال و ۵٪ نیز ۲۰ سال و به کشیدن سیگار اعتیاد داشتند. در کل، ۴۱٪ از افراد تحت مطالعه، سابقه‌ی اعتیاد به سیگار را ذکر کرده‌اند. در مطالعه‌ی شریفی راد و همکاران (۱۳۸۵) در اصفهان، ۲۹٪ از سالمندان، سابقه‌ی استعمال سیگار در دوران میانسالی را داشته‌اند که این میزان، کمتر از مطالعه‌ی حاضر می‌باشد (۱۶). همچنین، در مطالعه‌ی نائینی و همکاران (۱۳۸۳) در شهر اصفهان، از مجموع ۷۰۰ سالمند مورد مطالعه، ۸٪ آنان در زمان انجام مطالعه سیگار استعمال می‌کردند (۲۲)، که این میزان از مطالعه‌ی حاضر کمتر می‌باشد. به طور کلی، ۱۷٪ از سالمندان مورد مطالعه، به استعمال دخانیات، ۰٪ به قلیان و ۳٪ به چیق علاقه داشتند و ۷۹٪ از آنها، به مصرف هیچ یک از موارد بالا، علاقه‌ای نشان ندادند.

میانگین توده‌ی بدنی افراد مورد مطالعه، ۲۵/۷۲ کیلوگرم بر متر مربع با انحراف معیار ۴/۴۸ بود. سالمندان ساکن در شهرستان‌های شیروان، چرداول و ملکشاهی، از شاخص توده‌ی بدنی بالاتری نسبت به میانگین استانی و در نتیجه، سایر شهرستانهای استان برخوردار بودند. در مطالعه‌ی عزیزی و همکاران نشان داده شد که شاخص توده‌ی بدنی زنان و مردان به ترتیب برابر $28/5 \pm 4/6$ و $26/1 \pm 3/9$ کیلوگرم بر متر مربع بوده و زنان بیشتر از مردان، به اضافه وزن و چاقی مبتلا بوده‌اند (۲۲). در خصوص فعالیت‌های جسمی، از بین سالمندان مورد مطالعه، ۶۶٪ به منظور انجام فعالیت‌های

11. Hosseini Sadeh SR, Zabihi A, Bijani A. Prevalence of cardiovascular risk factors in elderly population in Amirshahr (2007). Salmand 2009;4(11):46–52. (Full Text in Persian)
12. WHO. Health care for the elderly. A manual for primary health care workers. Tehran: Behzisti Organization; 2008. p. 204–9. (Full Text in Persian)
13. Babatsikou F, Zavitsanou A. Epidemiology of hypertension in the elderly. Health Sci J 2010;4(1): 24–30.
14. Frost PH, Davis BR, Burlando AJ, Curb JD, Guthrie Jr GP, Isaacsohn JL, et al. Coronary heart disease risk factors in men and women aged 60 years and older: Findings from the systolic hypertension in the elderly program. Circulation 1996;94:26–34.
15. Benfante R, Reed D, Frank J. Does cigarette smoking have an independent effect on coronary heart disease incidence in the elderly? Am J Public Health 1991;81(7):897–9.
16. Sharifirad G, Mohebbi S, Matlabi M. The relationship of physical activity in middle age and cardiovascular problems in old age in retired people in Isfahan, 2006. Horizon Med Sci 2007;13(2):57–63. (Full Text in Persian)
17. Akbari Kamrani AA. Assessment of prevalence rate of complaints and rehabilitation needs of 150 older people referred to the educational, research and rehabilitation center for older people in 1999. J Rehabil 2001;2(1,2):46–50. (Full Text in Persian)
18. Dorosty AR, Alavi Naeini AM. Correlation of elderly nutritional status with cardio-vascular disease and diabetes. Tehran Univ Med J 2007;65(3):68–71. (Full Text in Persian)
19. Tootoonchi P. Prevalence of common chronic disease and some characteristics associated with disability in the elderly people covered by Tehran Imam Khomeini Relief Foundation and its influencing factors. Payesh 2004;3(3):219–25. (Full Text in Persian)
20. Hosseini SR, Zabihi A, Savadkohi S, Bijani A. Prevalence of chronic diseases in elderly population in Amirkola (2006-2007). J Babol Univ Med Sci 2008;10(2):68–75.
21. Joghataei MT, Nejati V. Study of health status of elderly people in Kashan. Salmand 2006;1(1):3–10.
22. Azizi F, Emami H, Salehi P, Ghanbarian A, Mirmiran P, Mirbolooki MR. Cardiovascular risk factors in the elderly: Tehran Lipid and Glucose Study (TLGS). Iran J Endocrinol Metab 2004;5(1):3–13.
23. Alavi Naini A, Dorosti Motlagh A, Aghdak P. Study of Obesity and underweight of elderly people and its some associated factors with using WHR, BMI and WHRT in Isfahan 1383. J Mazandaran Univ Med Sci 2004;16(52):117–23. (Full Text in Persian)
24. Alizadeh-Khoei M, Khoshbin S, Khavarpour F. Assessing quality of life, well being and depression among Iranian elderly in Australia. Salmand 2010;4(14):15–26. (Full Text in Persian)